



## **Cuando se reciben antibióticos antes de los tratamientos dentales**

Si es un paciente con ciertas clases de enfermedades del corazón o tiene una condición especial del corazón, o si le han reemplazado una articulación, es necesario cuidarse bien los dientes y las encías –no sólo para tener una sonrisa saludable, pero por su salud en general.

### **ENDOCARDITIS BACTERIANA**

Su dentista o su médico puede recomendarle que tome antibióticos antes de ir a una cita dental porque a veces se sangra durante los tratamientos dentales, y las bacterias de la boca podrían entrar en la corriente sanguínea. Es posible que estas bacterias lleguen al corazón. Esto representa un riesgo para algunas personas con anomalías del corazón porque las bacterias pueden causar endocarditis bacteriana, una inflamación seria de las válvulas o de los tejidos del corazón.

Algunas condiciones del corazón se asocian más frecuentemente con endocarditis que otras. Para determinar si una condición cardíaca existente presenta algún riesgo, el dentista necesita toda la información de la salud de usted en su formulario de historia médica. El formulario debe incluir el nombre y la dirección de su médico de cabecera o de su cardiólogo así como los nombres y las dosis de todos los medicamentos que está tomando. ¿Se aplica a usted alguno de lo siguiente?

- cirugía del corazón en los últimos seis meses
- marcapaso
- cirugía vascular (reemplazaron una arteria) en los últimos seis meses
- válvula artificial en el corazón
- antecedentes de fiebre reumática
- antecedentes de murmullo en el corazón (prolapso de la válvula mitral)
- endocarditis bacteriana previa
- desvío pulmonar sistémico
- defecto congénito de corazón
- disfunción valvular adquirida

Si tiene cualquiera de estas condiciones, si le han diagnosticado otras enfermedades del corazón o si su estado de salud ha cambiado desde su última visita, dígaselo a su dentista.

### **INFECCIONES DE LAS ARTICULACIONES ARTIFICIALES**

Es también posible que las bacterias que se encuentran comúnmente en la boca puedan viajar por la corriente sanguínea y formar colonias en la articulación artificial, lo que aumenta su riesgo de contraer una infección. Su dentista y su



American Dental Association  
www.ada.org

cirujano ortopédico, trabajando en conjunto, desarrollarán el tratamiento apropiado para usted.

Se recomienda la profilaxis de antibióticos por los primeros dos años después del reemplazo de la articulación para todos los que han recibido una articulación completa nueva. Después de dos años, solamente los pacientes con riesgo alto podrían necesitar antibióticos para los procedimientos de riesgo alto.

¿Se aplica a usted alguna de estas situaciones de riesgo alto?

- artritis reumatoide, lupus sistémico u otras condiciones médicas que causan que usted esté inmunocomprometido o inmunosuprimido.
- inmunosupresión causada por un tratamiento con medicamentos o con radiación
- malnutrición
- hemofilia
- infecciones de VIH
- diabetes dependiente de insulina (tipo 1)
- cáncer

Todos los pacientes en estas categorías de riesgo alto pueden necesitar antibióticos para todos los procedimientos dentales de riesgo alto.

## **LOS ANTIBIÓTICOS AYUDAN A PREVENIR LAS INFECCIONES**

Su dentista o su médico puede que le recete antibióticos para los procedimientos dentales que resultarían en sangrado de las encías o de las membranas mucosas en la boca. Hay recomendaciones para las prescripciones para los pacientes con condiciones del corazón en un reporte de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) y la Asociación Dental Americana. Las recomendaciones para las prescripciones para los pacientes con articulaciones artificiales completas se encuentran en un reporte de la Asociación Dental Americana y la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (American Academy of Orthopedic Surgeons).

Si está tomando un medicamento nuevo o diferente (sea con receta o sin receta) desde su última cita dental, notifíquesele a su dentista para que actualice su expediente médico. Si ha desarrollado alergias a cualquier medicamento desde su última visita, notifíquesele a su dentista.

Su dentista puede consultar a su médico, a su cardiólogo o su cirujano ortopédico para determinar qué antibiótico debe tomar antes de su visita dental. Si está tomando antibióticos por boca, asegúrese de comprar su receta antes de su próxima visita. Siga las instrucciones de la dosis y la frecuencia cuidadosamente.

Preparado por la División de Comunicaciones de la ADA, en colaboración con *The Journal of the American Dental Association*. Al contrario de otras partes de *JADA*, esta página puede ser cortada, copiada y repartida a los pacientes sin obtener antes el permiso de reproducción de *ADA Publishing Division*. Cualquier otro uso, copias



American Dental Association  
www.ada.org

o distribución, sea en forma impresa o electrónica, está estrictamente prohibido sin el consentimiento previo por escrito de *ADA Publishing Division*.

“Para el Paciente Dental” provee información general acerca de los tratamientos dentales para los pacientes dentales. Está diseñada para promover la discusión entre el dentista y el paciente acerca de las opciones de tratamiento y no sustituye la evaluación profesional del dentista basada en las necesidades y los deseos del paciente individual.

*JADA*, Vol. 134, noviembre 2003

Derechos del Autor © 2003 *American Dental Association*. Todos los derechos reservados.